

MATEMÁTICA

INSTRUÇÃO: Responder à questão 41 com base na tabela a seguir, que apresenta dados sobre as funções g , h , k , m , f .

t	$g(t)$	$h(t)$	$k(t)$	$m(t)$	$f(t)$
1	23	10	2,2	-1	4,0
2	24	20	2,5	1	4,5
3	26	29	2,8	-2	5,5
4	29	37	3,1	2	6,5
5	33	44	3,4	-3	7,5
6	38	50	3,7	3	8,5

41) A função cujo gráfico está sobre uma mesma reta é

- A) g
- B) h
- C) k
- D) m
- E) f

42) A distância entre o centro da circunferência de equação $(x - 2)^2 + (y + 5)^2 = 9$ e a reta de equação $2y + 5x = 0$ é

- A) -5
- B) 0
- C) 2
- D) 5
- E) 9






43) Se $p(x) = x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ é um polinômio em $\mathbb{C}$ e $p(0) = p(-i) = 0$, então $p(1)$ é

- A) -2
- B) -1
- C) 0
- D) 1
- E) 2

44) Um ponto se movimenta sobre um plano onde está situado um referencial cartesiano. Seu trajeto percorre a circunferência de equação $x^2 + y^2 = 1$ e seu deslocamento é feito a partir do ponto $(1, 0)$ no sentido anti-horário até a primeira interseção dessa circunferência com a reta $y = x$. Essa interseção é dada pelo ponto

- A) $(\cos 0^\circ, \sin 0^\circ)$
- B) $(\sin 30^\circ, \cos 30^\circ)$
- C) $(\cos 45^\circ, \sin 45^\circ)$
- D) $(\sin 60^\circ, \cos 60^\circ)$
- E) $(\sin 90^\circ, \cos 90^\circ)$

- 45) A imagem da função $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ é a Progressão Geométrica (1; 4; 16; 64; ...). Os pontos do gráfico de f podem pertencer à curva



- 46) O valor de $x + y$, para que o produto das matrizes

$A = \begin{bmatrix} 1 & x \\ y & 1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$ seja a matriz nula, é

- A) -1
B) 0
C) 1
D) 2
E) 4

47) O raio da base de um cone circular reto e a aresta da base de uma pirâmide quadrangular regular têm mesma medida. Sabendo que suas alturas medem 4cm, então a razão entre o volume do cone e o da pirâmide é

- A) 1
- B) 4
- C) $\frac{1}{\pi}$
- D) π
- E) 3π

48) Um baralho comum de 52 cartas tem três figuras (valeta, dama e rei) de cada um dos quatro naipes (paus, ouros, espadas e copas). Ao se retirar uma carta do baralho, a probabilidade de ser uma carta que apresente figura de paus é

- A) $\frac{1}{52}$
- B) $\frac{3}{52}$
- C) $\frac{7}{52}$
- D) $\frac{12}{52}$
- E) $\frac{13}{52}$

49) A terna (1, 2, 3) é solução do sistema

$$\begin{cases} -x + 2y - 2z = -b \\ 5x - y - az = -3b \\ -6x + y + z = b - a \end{cases}$$

Então, o valor de **a** é

- A) -4
- B) -3
- C) -2
- D) 3
- E) 4

50) Se $N = \log_2 15$, então

- A) $0 \leq N < 2$
- B) $2 \leq N < 3$
- C) $3 \leq N < 4$
- D) $4 \leq N < 5$
- E) $N \geq 5$

Cursos que Indicamos

Conheça os cursos e dê o próximo passo na sua preparação.

Clique na imagem ou no botão para acessar.



Código Matemática 2.0

Conhecer o curso



Curso Preparatório ENEM

Conhecer o curso



Curso Preparatório Redação ENEM

Conhecer o curso

