

VESTIBULAR



Inverno 2011

Prova 3 – Química

QUESTÕES OBJETIVAS

Nº DE ORDEM:
NOME DO CANDIDATO:

Nº DE INSCRIÇÃO:

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

1. Confira os campos Nº DE ORDEM, Nº DE INSCRIÇÃO e NOME, conforme o que consta na etiqueta fixada em sua carteira.
2. Confira se o número do gabarito deste caderno corresponde ao constante na etiqueta fixada em sua carteira. Se houver divergência, avise, imediatamente, o fiscal.
3. **É proibido folhear o Caderno de Provas antes do sinal, às 9 horas.**
4. Após o sinal, confira se este caderno contém 20 questões objetivas e/ou qualquer tipo de defeito. Qualquer problema, avise, imediatamente, o fiscal.
5. O tempo mínimo de permanência na sala é de 2 horas após o início da resolução da prova.
6. No tempo destinado a esta prova (4 horas), está incluído o de preenchimento da Folha de Respostas.
7. Transcreva as respostas deste caderno para a Folha de Respostas. A resposta correta será a soma dos números associados às proposições verdadeiras. Para cada questão, preencha sempre dois alvéolos: um na coluna das dezenas e um na coluna das unidades, conforme exemplo ao lado: questão 13, resposta 09 (soma das proposições 01 e 08).
8. Se desejar, transcreva as respostas deste caderno no Rascunho para Anotação das Respostas constante nesta prova e destaque-o, para retirá-lo hoje, nesta sala, no horário das 13h15min às 13h30min, mediante apresentação do documento de identificação do candidato. Após esse período, não haverá devolução.
9. Ao término da prova, levante o braço e aguarde atendimento. Entregue ao fiscal este caderno, a Folha de Respostas e o Rascunho para Anotação das Respostas.

09

13	
☒	01
☐	02
☐	03
☐	04
☐	05
☐	06
☐	07
☐	08
☒	09

Corte na linha pontilhada.

RASCUNHO PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS – PROVA 3 – INVERNO 2011

Nº DE ORDEM:

NOME:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20



UEM – Comissão Central do Vestibular Unificado

GABARITO 1

QUÍMICA

Questão 01

Considere todos os gases descritos abaixo como gases ideais e assinale o que for **correto** (Dados $R = 0,082 \text{ atm L K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$).

- 01) O volume ocupado por 100 mols de $\text{O}_{2(g)}$ quando comprimido a 100 atm à 25°C é de, aproximadamente, 24,5 litros.
- 02) Nas CNTP, um gás de massa molar igual a 75 g/mol possui densidade aproximadamente igual a 30 gramas por litro.
- 04) Em 30 litros de uma mistura gasosa contendo 19 g de F_2 e 8 g de O_2 a 27°C , a pressão parcial do O_2 é menor do que a pressão parcial do F_2 .
- 08) As forças de atração e repulsão entre as moléculas gasosas são desprezíveis.
- 16) Nas mesmas condições experimentais, o gás amônia se difunde mais rapidamente do que o gás cloro.

☐

Questão 02

Assinale o que for **correto**.

- 01) Carbono, hidrogênio e oxigênio são os principais constituintes dos compostos inorgânicos.
- 02) A hibridização é um modelo utilizado para explicar a quantidade de ligações formadas somente para o átomo de carbono.
- 04) No estado fundamental, o átomo de carbono possui dois elétrons desemparelhados nos orbitais p .
- 08) Na molécula do ácido cianídrico, o carbono efetua duas ligações sigma e duas ligações pi.
- 16) O átomo de carbono pode formar compostos moleculares e iônicos.

☐

Questão 03



Assinale o que for **correto**.

- 01) De acordo com Thomson, os átomos eram semelhantes a bolas de bilhar. Mais tarde, também na tentativa de elucidar o átomo, Rutherford descobriu a radioatividade.
- 02) Um elétron identificado com os números quânticos principal e magnético iguais a 4 e -1, respectivamente, pode ser um dos elétrons de valência do cálcio.
- 04) Quando dois orbitais atômicos p se aproximam paralelamente, tem-se a formação de uma ligação π (pi) ou de um orbital molecular do tipo π (pi).
- 08) O sódio possui maior caráter metálico do que o cério.
- 16) A hibridização na molécula de BF_3 é do tipo sp^2 e sua geometria é trigonal plana.

☐

Questão 04

Mentol e limoneno são duas substâncias de origem vegetal, cujas estruturas estão representadas a seguir. Sobre essas moléculas, assinale o que for **correto**.



- 01) O limoneno é um composto aromático.
 02) O limoneno apresenta fórmula molecular $C_{10}H_{16}$.
 04) O mentol possui cadeia carbônica, saturada, mista e heterogênea.
 08) O limoneno apresenta dois carbonos quaternários.
 16) Moléculas de mentol podem formar ligações de hidrogênio entre si e com a água.


☐
Questão 05

Assinale o que for **correto**.

- 01) Enquanto a definição de Arrhenius para ácido e base adapta-se somente em meio aquoso, a de Brønsted e Lowry estende-se para qualquer meio.
 02) Em solução aquosa ácida, enquanto Arrhenius sugere a existência de um próton $H^+_{(aq)}$, Brønsted e Lowry sugerem que esse próton esteja ligado a uma molécula de água, formando o íon $H_3O^+_{(aq)}$.
 04) O ácido sulfúrico é um líquido incolor, um pouco viscoso e é um poderoso agente desidratante.
 08) O hidróxido de magnésio é uma dibase usada comercialmente para a produção de leite de magnésia (laxante e antiácido estomacal).
 16) O calcáreo entra em efervescência, quando colocado em uma solução ácida, porque a reação entre ele e o ácido libera CaO gasoso.

☐
Questão 06

A ibogaína (representada a seguir) está sendo testada em alguns países no tratamento contra a dependência química. Sobre essa substância, assinale o que for **correto**.



- 01) A molécula da ibogaína tem 8 elétrons em ligações π e 8 elétrons não ligantes.
 02) Os carbonos assinalados como 1, 2 e 3 possuem hibridização sp^3 , sp^2 e sp , respectivamente.
 04) A molécula da ibogaína possui os grupos funcionais éster e amina.
 08) A molécula da ibogaína apresenta carbonos quirais em sua estrutura.
 16) A molécula da ibogaína possui somente sete átomos de hidrogênio.

☐

Questão 07

Assinale o que for **correto**.

- 01) A reação $2\text{H}_{2(\text{g})} + \text{O}_{2(\text{g})} \Rightarrow 2\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$ pode ser considerada uma reação de síntese e também uma reação de oxirredução.
- 02) A reação entre flúor gasoso e cloreto de sódio aquoso formando fluoreto de sódio aquoso e cloro gasoso pode ser considerada uma reação de deslocamento e também uma reação de oxirredução.
- 04) Na reação de 100 gramas de hidrogênio gasoso com 60 mols de sódio metálico, tem-se a formação de 2440 gramas de hidreto de sódio.
- 08) Na reação $\underline{a}\text{NaOH} + \underline{b}\text{Cl}_2 \Rightarrow \underline{c}\text{NaCl} + \underline{d}\text{NaClO}_3 + \underline{e}\text{H}_2\text{O}$, o Cl_2 sofre oxidação e redução.
- 16) Na reação $\underline{a}\text{NaOH} + \underline{b}\text{Cl}_2 \Rightarrow \underline{c}\text{NaCl} + \underline{d}\text{NaClO}_3 + \underline{e}\text{H}_2\text{O}$, o somatório dos coeficientes estequiométricos a, b, c, d e e, em menores números inteiros, é 17.

☐
Questão 08

Assinale o que for **correto**, considerando as reações nas CNTP.

- 01) Na reação $\text{F}_{2(\text{g})} + \text{H}_{2(\text{g})} \Rightarrow 2\text{HF}_{(\text{g})}$ $\Delta H = -269\text{kJ/mol}$ $\text{HF}_{(\text{g})}$, o somatório das entalpias dos reagentes é igual a $+269\text{kJ/mol}$.
- 02) Dada a reação $2\text{Na}_2\text{O}_{(\text{s})} \Rightarrow 2\text{Na}_{(\text{s})} + \text{O}_{2(\text{g})}$ $\Delta H = +824\text{ kJ}$, pode-se determinar que a quantidade de energia necessária para decompor 620 g de $\text{Na}_2\text{O}_{(\text{s})}$ é igual a 8240 kJ.
- 04) Considerando que a energia da ligação H-H é 437 kJ/mol, que da ligação O=O é de 494 kJ/mol e da ligação H-O é de 463 kJ/mol, pode-se estimar que a entalpia padrão de formação da $\text{H}_2\text{O}_{(\text{g})}$, em kJ/mol $\text{H}_2\text{O}_{(\text{g})}$, a partir de $\text{O}_{2(\text{g})}$ e $\text{H}_{2(\text{g})}$, é de + 442.
- 08) A mudança de estado físico $\text{H}_2\text{O}_{(\text{s})}$ para $\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$ deve ser um processo endotérmico.
- 16) A mudança de estado $\text{I}_{2(\text{g})}$ para $\text{I}_{2(\text{s})}$ é um processo exotérmico.

☐
Questão 09

Assinale o que for **correto**. (Dados: K_C = constante de equilíbrio; K_P = constante de equilíbrio em termos de pressão e R = constante dos gases).

- 01) Para a reação, $\text{C}_2\text{H}_{4(\text{g})} + \text{I}_{2(\text{g})} \rightleftharpoons \text{C}_2\text{H}_4\text{I}_{2(\text{g})}$, que ocorre em sistema fechado de volume V e temperatura T constante e possui $K_C = 10\text{ atm}^{-1}$, o valor de K_P é $10/RT$.
- 02) Para a reação, $\text{Pb}(\text{NO}_3)_{2(\text{aq})} + 2\text{NaI}_{(\text{aq})} \rightleftharpoons \text{PbI}_{2(\text{s})} + 2\text{NaNO}_{3(\text{aq})}$, que possui as concentrações no equilíbrio (em mols por litro): $[\text{Pb}(\text{NO}_3)_2]=5$; $[\text{NaI}]=10$; $[\text{PbI}_2]=\text{constante}$; $[\text{NaNO}_3]=10$, o valor de $K_C = 0,2\text{ mol/litro}$.
- 04) Tanto K_P quanto K_C só variam com uma variação de temperatura.
- 08) Assim como K_C , o quociente de equilíbrio (Q_C) é uma constante que depende somente da temperatura.
- 16) Ao se adicionar $\text{CO}_{2(\text{g})}$ no sistema contendo a reação em equilíbrio $\text{CO}_{(\text{g})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{g})} \rightleftharpoons \text{CO}_{2(\text{g})} + \text{H}_{2(\text{g})}$, haverá um deslocamento no sentido da reação direta, com a formação de $\text{H}_{2(\text{g})}$.

☐



A recente “lei seca” (Lei 11.705, de 2008) estabelece que quem conduzir veículos automotores sob a influência de qualquer concentração alcoólica no sangue (tolerância zero) está sujeito à multa e também proíbe a condução do veículo, caso a concentração esteja igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Sabendo-se que algumas marcas de cerveja indicadas no rótulo como “sem álcool” possuem ainda assim 0,5% de álcool (título em volume) e considerando as informações I, II, III e IV, que vêm a seguir, assinale o que for **correto**.

- I) O indivíduo ingere apenas a cerveja a que se refere o enunciado e que todo álcool ingerido estará presente no sangue no momento do teste do bafômetro e nenhum consumo metabólico ocorre no corpo;
 - II) O termo “álcool” refere-se a etanol, densidade = 0,8 g/cm³;
 - III) O volume contido em uma lata de cerveja é 350 mililitros;
 - IV) Para descobrir o volume aproximado (em litros) de sangue no corpo humano, basta multiplicar seu peso (massa) por 0,07.
- 01) Após a ingestão de 5 latas da cerveja, um indivíduo de 70 kg, ao passar pelo teste do bafômetro, não só será multado como também estará proibido de conduzir o veículo.
 - 02) Após a ingestão de 10 latas da cerveja, um indivíduo de 150 kg terá concentração de álcool no sangue, em porcentagem em volume, menor do que 0,2%.
 - 04) Após a ingestão de 2 latas da cerveja, um indivíduo terá 7 mL de álcool no sangue.
 - 08) A massa de álcool em uma lata de cerveja é de 1,75 gramas.
 - 16) Em uma lata de cerveja, a concentração em mols por litro de etanol é igual a 10.

☐

Questão 11

Considere as reações I e II e assinale o que for **correto**.




- 01) O composto **A** é o acetato de metila.
- 02) O composto **B** é um ácido carboxílico.
- 04) Os compostos **A** e **B** são isômeros de função.
- 08) Com a adição de água na reação I, o equilíbrio é deslocado para a direita.
- 16) A reação entre ácido acético e etanol resulta no composto **A**.

☐

Questão 12

Considere a presença da Química no cotidiano e assinale o que for **correto**.

- 01) O descarte indevido de lâmpadas fluorescentes é um risco para o meio ambiente e para a saúde humana devido à radiação emitida pelas substâncias presentes nessas lâmpadas.
- 02) A incineração é uma alternativa totalmente limpa ao tratamento do lixo, pois destrói o material orgânico e não gera nenhum outro tipo de contaminante.
- 04) O alumínio é um metal muito utilizado na fabricação de utensílios domésticos, janelas e latas por ser um excelente condutor térmico, ter baixa densidade e possuir excelente resistência à corrosão.
- 08) Por ser um polímero de adição, os materiais produzidos com polietileno tereftalato não podem ser reciclados.
- 16) A ocorrência da reação química descrita a seguir tem como consequência a diminuição do pH da água da chuva.

☐**Questão 13**

Assinale o que for **correto**.

- 01) Estereoisômeros são compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, porém diferentes arranjos espaciais.
- 02) O composto 1-cloro-2-metilciclopentano apresenta isomeria geométrica.
- 04) Os compostos propanal e propanona são isômeros de função.
- 08) A conversão do *trans*-but-2-eno em *cis*-but-2-eno ocorre espontaneamente à temperatura ambiente.
- 16) O alceno, de menor massa molar, que pode se apresentar como dois isômeros opticamente ativos, tem fórmula molecular C_6H_{14} .

☐**Questão 14**

Assinale o que for **correto**.

- 01) Ao inserir um catalisador em um meio reacional cuja reação possa ser auxiliada por catálise, espera-se que o tempo decorrido para a formação do produto desejado seja menor.
- 02) A lei de velocidade é usada para estabelecer a ordem de uma reação, mas nem sempre pode ser usada para dizer sobre a molecularidade de uma reação.
- 04) Em uma catálise heterogênea, os reagentes e o catalisador formam um sistema com mais de uma fase, em que os reagentes estão em uma dessas fases e o catalisador em outra.
- 08) A reação $\text{A} + \text{X} \Rightarrow \text{XA}$, que possui a lei de velocidade $v = k [\text{X}]$ determinada experimentalmente, terá sua velocidade dependente somente da concentração de X.
- 16) Na reação $\text{HNO}_{3(\text{l})} + \text{NaOH}_{(\text{s})} \Rightarrow \text{NaNO}_{3(\text{s})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$, feita em recipiente hermeticamente fechado, um aumento na pressão do sistema altera a velocidade da reação.

☐

Questão 15

Assinale o que for **correto**.

- 01) O hexan-1-ol, por ser um composto polar, é totalmente solúvel em água.
- 02) A reação entre ácido butanoico e hidróxido de sódio produz um composto iônico.
- 04) Os ácidos carboxílicos e as cetonas de massa molar aproximada têm pontos de ebulição semelhantes porque ambos apresentam átomo de oxigênio em sua estrutura.
- 08) O ponto de ebulição da propilamina é 47,8 °C e da trimetilamina é 2,9 °C. Essa diferença deve-se ao fato de que esses compostos apresentam diferentes basicidades.
- 16) As interações intermoleculares existentes nas moléculas de metilbutano são do tipo forças de van der Waals.


☐
Questão 17

Assinale o que for **correto**.

- 01) Para uma monobase fraca, quanto maior sua concentração em mols por litro, menor será o grau de dissociação.
- 02) Em 1 litro de uma solução aquosa de HCl com pH = 2 foram adicionados 999 litros de água. Assim, o pH, após essa diluição, é igual a 3.
- 04) Para uma solução de pOH = 11, tem-se $[H^+] < [OH^-]$.
- 08) Na hidrólise salina de um sal formado a partir de um ácido fraco com uma base fraca, quando $K_a > K_b$, a solução resultante terá pH < 7.
- 16) Uma solução aquosa de NH_4Cl 0,2 mol/litro apresenta um grau de hidrólise de 1%. Assim, essa solução terá caráter ácido com $K_h \approx 2 \times 10^{-5}$.

☐
Questão 16

Considere o esquema a seguir e assinale o que for **correto**.



- 01) O propeno e o éter dipropílico foram obtidos, respectivamente, por reações de eliminação e substituição.
- 02) Os álcoois possuem caráter ácido mais forte que os fenóis, isto é, têm maior facilidade de se ionizar em solução aquosa.
- 04) Na síntese do éter, ocorre uma desidratação intermolecular e, na síntese do alceno, uma desidratação intramolecular.
- 08) Se o metanol fosse colocado para reagir nas mesmas condições apresentadas no esquema acima, seria obtido um único produto de desidratação.
- 16) É possível obter um éster a partir de uma reação de oxidação do éter dipropílico.

☐

Questão 18

A seguir, encontram-se alguns dados sobre propriedades de três materiais diferentes que possuem o mesmo volume a 20° C.


Material	Massa (g)	Temperatura de fusão (°C)	Temperatura de ebulição (°C)
A	115	80	218
B	0,13	-219	-183
C	80	-39 a -32	105 a 112

A esse respeito, assinale o que for **correto**.

- 01) Fusão e vaporização são transformações físicas endotérmicas.
 02) Se o material A não for solúvel em C, então ele deverá flutuar se for adicionado a um recipiente contendo o material C, ambos a 20° C.
 04) Os materiais B e C são substâncias puras.
 08) Apenas o material C está no estado líquido a 20° C.
 16) Os materiais A e B podem ser variedades alotrópicas.

☐
Questão 19

Considere uma reação eletroquímica espontânea (do tipo pilha) na qual são envolvidas as semirreações I e II, a seguir. Sobre essas semirreações, considere que ocorram em soluções aquosas de concentração 1,0 mol/L a 25 °C e 1 atm (condições padrão) e assinale o que for **correto**.



- 01) A força eletromotriz desenvolvida na reação é 1,08V.
 02) De acordo com a reação redox global, ocorre uma redução do átomo de enxofre de S^{6+} (no $\text{SO}^{2-}_{4(aq)}$) para S^{4+} (no $\text{SO}_{2(g)}$).
 04) A espécie $\text{SO}^{2-}_{4(aq)}$ é um agente redutor mais poderoso (melhor redutor) do que a espécie $\text{MnO}_{2(s)}$.
 08) A semirreação que possui maior potencial padrão de oxidação é a II.
 16) O número de elétrons envolvidos na reação é 4.

☐
Questão 20

Considere as seguintes afirmações em relação ao Na_2CO_3 e assinale o que for **correto**.

- 01) 106 g de Na_2CO_3 contém $6,0 \times 10^{23}$ átomos de carbono.
 02) O Na_2CO_3 apresenta a seguinte composição centesimal: 43,4% de Na, 11,3% de C e 45,3% de O.
 04) A partir de 310 g de H_2CO_3 e 400 g de NaOH, podem ser obtidos 5 mols de Na_2CO_3 .
 08) 10 mols de Na_2CO_3 contém 30 átomos de oxigênio.
 16) O Na_2CO_3 é um composto anfiprótico, pois pode assumir comportamento de ácido ou de base, dependendo do meio.

☐

Cursos que Indicamos

Conheça os cursos e dê o próximo passo na sua preparação.

Clique na imagem ou no botão para acessar.



Código Matemática 2.0

Conhecer o curso



Curso Preparatório ENEM

Conhecer o curso



Curso Preparatório Redação ENEM

Conhecer o curso

