


INSTRUÇÃO GERAL: Para cada questão, escolher apenas uma alternativa correta.

QUÍMICA

- 1) Comparando o cloro e o sódio, os dois elementos químicos formadores do sal de cozinha, é correto afirmar que
- A) o cloro tem menor energia de ionização.
 - B) o sódio tem raio atômico maior.
 - C) o sódio tem maior afinidade eletrônica.
 - D) os íons de ambos são isoeletrônicos.
 - E) ambos pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica.

INSTRUÇÃO: Responder à questão 2 com base nas seguintes informações:

Quando uma célula produz uma proteína, a cadeia de polipeptídeo dobra-se espontaneamente para assumir certa forma. Um dos dobramentos dessa cadeia polipeptídica envolve várias forças de interação entre várias cadeias laterais de aminoácidos, conforme exemplificado no esquema a seguir.




- 2) Os tipos de forças de interação que ocorrem em (I) e (II) são, respectivamente,
- A) dipolo-dipolo e ligação de hidrogênio.
 - B) ligação de hidrogênio e dipolo-dipolo.
 - C) dipolo induzido-dipolo induzido e ligação de hidrogênio.
 - D) dipolo induzido-dipolo induzido e dipolo-dipolo.
 - E) dipolo induzido-dipolo e dipolo-dipolo.

- 3) A combustão completa de 0,1 mol de um hidrocarboneto gerou 22 g de gás carbônico e 10,8 g de água. Conclui-se que este hidrocarboneto é um
- A) alcano.
 - B) cicloalcano.
 - C) alceno.
 - D) alcadieno.
 - E) alcino.

INSTRUÇÃO: Responder à questão 4 com base nos dados a seguir.

A D-glicose, na presença de uma enzima, ou gás hidrogênio com catalisador metálico, sofre reação, produzindo o sorbitol. Concentrações elevadas de glicose intracelular podem produzir um aumento significativo na quantidade de sorbitol, o qual, por ser mais hidrofílico, permanece dentro da célula e acumula-se, provocando efeitos osmóticos e edema celular devido à retenção de água. Essa reação pode ser representada pela equação:



- 4) Com relação à equação, a afirmativa correta é
- A) O grupo aldeídico é oxidado a álcool primário.
 - B) O grupo cetona é reduzido a álcool primário.
 - C) A D-glicose e o sorbitol formam um par de isômeros de função.
 - D) A D-glicose é a substância oxidante e o H₂ é o redutor.
 - E) A massa molar da D-glicose é maior do que a massa molar do sorbitol.

- 5) Uma solução de vinagre, segundo a legislação brasileira, deve conter entre 0,9 e 1,8 mol.L⁻¹ de ácido acético, CH₃COOH. Os rótulos das embalagens de vinagre apresentam a concentração em porcentagem peso/volume. Os valores que atendem à legislação brasileira estão dentro de uma faixa, em %(p/v), de:


A) 0,9 a 1,8
B) 1,8 a 3,6
C) 3,6 a 7,2
D) 4,5 a 9,0
E) 5,4 a 10,8

- 6) Existem várias maneiras de medir o pH de uma solução. A mais simples consiste na utilização de indicadores, que são substâncias que apresentam colorações bem definidas, dependendo da acidez ou da alcalinidade da solução. O papel tornassol vermelho, por exemplo, adquire coloração azul quando o meio é básico. O caráter de várias amostras foi testado com papel tornassol vermelho, que adquiriu coloração azul apenas quando a solução era de:

A) NH₄ClO₃
B) H₂S
C) CO₂
D) MgCl₂
E) NaHCO₃

INSTRUÇÃO: Responder à questão 7 com base na análise das seguintes informações:

A penicilina, antibiótico natural derivado de um fungo e descoberto por Alexander Fleming, está disponível como fármaco desde a década de 40, quando foi desenvolvida técnica de congelamento e preparação industrial. Este antibiótico sofre uma deterioração com o tempo, conforme o gráfico apresentado abaixo:





- 7) Com base nas informações acima, conclui-se que a velocidade de deterioração da penicilina nas primeiras dez semanas é, em mol.L⁻¹/semana, aproximadamente:

A) 0,0025
B) 0,01
C) 0,025
D) 0,125
E) 0,166

INSTRUÇÃO: Responder à questão 8 com base nas informações abaixo:

Uma importante aplicação dos calores de dissolução são as compressas de emergência, usadas como primeiro-socorro em contusões sofridas, por exemplo, durante práticas esportivas. Exemplos de substâncias que podem ser utilizadas são CaCl_{2(s)} e NH₄NO_{3(s)}, cuja dissolução em água é representada, respectivamente, pelas equações termoquímicas:




- 8) Com base nessas equações termoquímicas, é correto afirmar que
- A) a compressa de CaCl₂ é fria, pois a reação ocorre com absorção de calor.
- B) a compressa de NH₄NO₃ é quente, uma vez que a reação ocorre com liberação de calor.
- C) a compressa de CaCl₂ é quente, já que a reação é exotérmica.
- D) a compressa de NH₄NO₃ é fria, visto que a reação é exotérmica.
- E) o efeito térmico produzido em ambas é o mesmo.

- 9) Considere duas soluções aquosas, uma de NiSO_4 e outra de AgNO_3 . Quando a mesma quantidade de eletricidade passa através das duas soluções, são depositados 0,1 mol de Ni metálico. Com base nessa informação, podemos determinar que a massa, em grama, de Ag metálica depositada é de, aproximadamente,

- A) 2,2
- B) 5,4
- C) 10,8
- D) 21,6
- E) 43,2

INSTRUÇÃO: Responder à questão 10 com base nas seguintes informações:

O glutamato de sódio, representado abaixo, é usado na indústria alimentícia para realçar o sabor dos alimentos. Acredita-se que sua atividade induz a um aumento de salivação, o qual produz uma maior sensibilidade da língua aos sabores.



Glutamato de sódio

- 10) Com base na fórmula do glutamato de sódio, conclui-se que:
- A) O ácido glutâmico que lhe dá origem é um composto de função mista que apresenta as funções orgânicas amina e ácido carboxílico.
 - B) O glutamato de sódio apresenta exclusivamente ligações químicas covalentes polares entre seus átomos.
 - C) A hidrólise do glutamato de sódio resulta em uma solução com pH menor do que 7.
 - D) Uma solução aquosa de glutamato de sódio não é condutora de corrente elétrica.
 - E) O glutamato de sódio é insolúvel em água e apresenta ponto de fusão baixo.

Cursos que Indicamos

Conheça os cursos e dê o próximo passo na sua preparação.

Clique na imagem ou no botão para acessar.



Código Matemática 2.0

Conhecer o curso



Curso Preparatório ENEM

Conhecer o curso



Curso Preparatório Redação ENEM

Conhecer o curso

