

PROVA DE QUÍMICA II


QUESTÃO 47

Os elementos **A** e **Z**, do mesmo período da tabela periódica, apresentam as seguintes configurações eletrônicas s^2p^2 e s^2p^5 , respectivamente, em suas camadas de valência. A fórmula do composto constituído pelos elementos **A** e **Z** e o tipo de ligação existente são respectivamente iguais a:

- a) AZ_4 , covalente.
- b) AZ_2 , iônica.
- c) AZ_4 , iônica.
- d) AZ_2 , covalente.

QUESTÃO 48

Um dos combustíveis utilizado em motores de foguetes é a hidrazina ($NH_2 - NH_2$). A reação de combustão que ocorre pode ser representada pela seguinte equação:



Conhecendo-se as energias de ligação representadas na tabela abaixo:


Ligação	Energia ($kJ.mol^{-1}$)
N - H	390
N - N	160
N $\equiv$ N	950
O = O	498
H - O	460

o valor da entalpia (ΔH) de combustão da hidrazina, em $kJ.mol^{-1}$, é igual a:

- a) +572,0
- b) +348,0
- c) -572,0
- d) -348,0

QUESTÃO 49

Há um tipo de bafômetro, que se fundamenta na reação representada pela seguinte equação:




O álcool etílico ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$), presente no ar expirado pelo indivíduo, transforma o dicromato de potássio ($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$) alaranjado, em sulfato de cromo III ($\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$) esverdeado. Um equipamento eletrônico detecta essa variação de cor, que é tanto mais pronunciada quanto maior o grau de embriaguez.

Considerando-se esse processo, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) o álcool etílico é oxidado a ácido acético.
- b) o bicromato de potássio funciona como agente oxidante.
- c) quanto mais alaranjado ficar o sistema, maior será o grau de embriaguez do indivíduo.
- d) a variação do número de oxidação para cada átomo cromo é igual a 3.

QUESTÃO 50

A adrenalina, um hormônio elaborado pela parte medular das glândulas suprarrenais e liberado pela excitação das fibras nervosas, é um potente vasoconstritor e hipertensor. Apresenta a seguinte fórmula estrutural:



Considerando-se essa estrutura, é **INCORRETO** afirmar que ela apresenta:

- a) isomeria cis-trans.
- b) carbonos com hibridações sp^2 e sp^3 .
- c) grupos funcionais de álcool, fenol e amina.
- d) fórmula molecular $\text{C}_9\text{H}_{13}\text{O}_3$.

QUESTÃO 51

Os indicadores de pH são substâncias que mudam de cor em função da acidez ou basicidade do meio em que se encontram. Considere um indicador que apresenta a cor amarela em meio ácido, a cor verde em meio neutro e a cor azul em meio básico. É **CORRETO** afirmar que:

- a) em contato com uma solução aquosa de NaOH , a cor desse indicador será amarela.
- b) em contato com uma solução aquosa de HCl , a cor desse indicador será azul.
- c) em contato com uma solução de amoníaco, a cor desse indicador será verde.
- d) em contato com suco de limão, a cor desse indicador será amarela.

QUESTÃO 52

Uma pilha é realizada, nas condições padrões, a partir dos pares redox:

$\text{Pb}^{2+} / \text{Pb}$ ($E^\circ = -0,13 \text{ V}$) e

$\text{Sn}^{2+} / \text{Sn}$ ($E^\circ = -0,14 \text{ V}$).

Sua força eletromotriz (fem) é:

- a) $-0,01 \text{ V}$
- b) $+0,01 \text{ V}$
- c) $-0,27 \text{ V}$
- d) $+0,27 \text{ V}$

QUESTÃO 53

Os efeitos da variação da temperatura em uma reação química $\text{A} \rightarrow \text{B}$ são mostrados na tabela abaixo:

Temperaturas	Concentração inicial de A	Tempo gasto para o consumo total de A
T_1	1 mol L^{-1}	40 s
T_2	1 mol L^{-1}	60 s
T_3	2 mol L^{-1}	60 s

Considerando-se essas informações, é **CORRETO** afirmar:

- a) A temperatura T_1 é inferior à T_2 .
- b) A temperatura T_2 é superior à T_3 .
- c) A concentração final de B é aumentada com o aumento da temperatura.
- d) Na temperatura T_3 , a reação ocorre com maior velocidade que na temperatura T_1 .

Cursos que Indicamos

Conheça os cursos e dê o próximo passo na sua preparação.

Clique na imagem ou no botão para acessar.



Código Matemática 2.0

Conhecer o curso



Curso Preparatório ENEM

Conhecer o curso



Curso Preparatório Redação ENEM

Conhecer o curso

