

QUÍMICA

Prova de 2ª Etapa

vestibular UFMG 2008



a ciência é você quem faz

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO.

Leia atentamente as instruções que se seguem.

- 1 - Este Caderno de Prova contém **sete** questões, constituídas de itens e subitens, e é composto de **dezesseis** páginas, numeradas de 3 a 15.
Antes de começar a resolver as questões, verifique se seu Caderno está **completo**.

Caso haja algum problema, solicite a **substituição** deste Caderno.

ATENÇÃO: Os Aplicadores **NÃO** estão autorizados a dar quaisquer explicações sobre questões das provas. **NÃO INSISTA** em pedir-lhes ajuda.

- 2 - Esta prova vale **100** pontos, assim distribuídos:
- Questões 01, 04 e 05: **14** pontos cada uma.
 - Questão 02: **16** pontos.
 - Questão 03: **17** pontos.
 - Questão 06: **15** pontos.
 - Questão 07: **10** pontos.
- 3 - **NÃO escreva seu nome nem assine nas folhas desta prova.**
- 4 - A página 3 deste Caderno contém uma tabela periódica.
- 5 - Leia cuidadosamente cada questão da prova e escreva a resposta, **A LÁPIS**, nos espaços correspondentes.
Só será corrigido o que estiver dentro desses espaços.
NÃO há, porém, obrigatoriedade de preenchimento total desses espaços.
- 6 - Não escreva nos espaços reservados à correção.
- 7 - Ao terminar a prova, entregue este Caderno ao Aplicador.

FAÇA LETRA LEGÍVEL.

Duração desta prova: TRÊS HORAS.

ATENÇÃO: Terminada a prova, recolha seus objetos, deixe a sala e, em seguida, o prédio. A partir do momento em que sair da sala e até estar fora do prédio, continuam válidas as proibições ao uso de aparelhos eletrônicos e celulares, bem como não lhe é mais permitido o uso dos sanitários.

Impressão digital do
polegar direito



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

COLE AQUI A ETIQUETA

TABELA PERIÓDICA DOS ELEMENTOS

		Número atômico — 1 Massa atômica — 1,0																	
I (IA)		18 (0)																	
1°	1 H 1,0	2 He 4,0																	
2°	3 Li 6,9	4 Be 9,0																	
3°	11 Na 23,0	12 Mg 24,3	13 Al 27,0	14 Si 28,1	15 P 31,0	16 S 32,1	17 Cl 35,5	18 Ar 39,9											
4°	19 K 39,1	20 Ca 40,1	21 Sc 45,0	22 Ti 47,9	23 V 50,9	24 Cr 52,0	25 Mn 54,9	26 Fe 55,8	27 Co 58,9	28 Ni 58,7	29 Cu 63,5	30 Zn 65,4	31 Ga 69,7	32 Ge 72,6	33 As 74,9	34 Se 79,0	35 Br 79,9	36 Kr 83,8	
5°	37 Rb 85,5	38 Sr 87,6	39 Y 88,9	40 Zr 91,2	41 Nb 92,9	42 Mo 96,0	43 Tc (98)	44 Ru 101,1	45 Rh 102,9	46 Pd 106,4	47 Ag 107,9	48 Cd 112,4	49 In 114,8	50 Sn 118,7	51 Sb 121,8	52 Te 127,6	53 I 126,9	54 Xe 131,3	
6°	55 Cs 132,9	56 Ba 137,3	57 * La 138,9	72 Hf 178,5	73 Ta 180,9	74 W 183,8	75 Re 186,2	76 Os 190,2	77 Ir 192,2	78 Pt 195,1	79 Au 197,0	80 Hg 200,6	81 Tl 204,4	82 Pb 207,2	83 Bi 209,0	84 Po (209)	85 At (210)	86 Rn (222)	
7°	87 Fr (223)	88 Ra (226)	89 ** Ac (227)	104 Rf (267)	105 Db (268)	106 Sg (271)	107 Bh (272)	108 Hs (270)	109 Mt (276)	110 Ds (281)	111 Rg (280)	112 (285)	113 (284)	114 (289)	115 (288)	116 (293)		118 (294)	

QUESTÃO 01

Utilizada comumente para desinfecção, a água clorada é obtida por meio de borbulhamento do gás cloro em água, num processo que corresponde à reação descrita nesta equação:




Outro produto igualmente empregado para desinfecção é a água sanitária, que, entre outras formas, pode ser obtida, também, por borbulhamento de gás cloro numa solução de hidróxido de sódio, NaOH (aq), em vez de apenas em água.

1. Considerando a equação da solubilização do cloro gasoso em água, **ESCREVA** a equação química balanceada que representa a solubilização do mesmo gás numa solução de NaOH (aq).

2. Sabe-se que o gás cloro é pouco solúvel em água; porém, em solução aquosa básica, sua solubilidade aumenta.

Considerando o equilíbrio químico que ocorre no processo de obtenção da água clorada e a equação química escrita no item 1 desta questão, **JUSTIFIQUE** o aumento da solubilidade do gás cloro quando se usa uma solução básica em vez de apenas água.

3. O teor de cloro em água sanitária pode ser determinado por meio de duas reações químicas, como representado nestas equações:



Para se determinar o teor de cloro, uma amostra de 100 mL de água sanitária foi analisada. Nesse processo, foram gastos 0,1 mol de $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ para reagir, completamente, com o iodo produzido após a adição de iodeto de potássio.

CALCULE a concentração de cloro, **em gramas por litro**, presente nessa amostra.


(Deixe seus cálculos indicados, explicitando, assim, seu raciocínio.)

Concentração de cloro:



QUESTÃO 02

Quando aquecido em um recipiente fechado, o $I_2(s)$ sublima e forma $I_2(g)$. Estabelece-se, então, o equilíbrio representado nesta equação:



1. **Assinalando** com um **X** a quadrícula correspondente, **INDIQUE** se a sublimação é **exotérmica** ou **endotérmica**.


A sublimação é ☐ exotérmica. ☐ endotérmica.

2. **Assinalando** com um **X** a quadrícula correspondente, **INDIQUE** se, com o aumento da temperatura, a constante de equilíbrio da sublimação do I_2 **diminui**, **permanece constante** ou **aumenta**.

A constante de equilíbrio ☐ diminui. ☐ permanece constante. ☐ aumenta.

3. Dois balões, **A** e **B**, abertos e em contato com a atmosfera, estão conectados por uma válvula, que está, inicialmente, fechada.

Nesta figura, estão representados, esquematicamente, os dois procedimentos realizados nesse sistema:



- **Procedimento 1** – Adiciona-se $I_2(s)$ ao balão A e, imediatamente, os dois balões são tampados.
- **Procedimento 2** – A válvula que conecta os dois balões é aberta.

Assinalando com um **X** a quadrícula correspondente, **INDIQUE** se, **após** se realizar o procedimento 1 e o sistema atingir o equilíbrio, a pressão dentro do balão A será **menor**, **igual** ou **maior** que a pressão dentro do balão B.

Considere que, nesse processo, o iodo sublima e que, nos dois balões, a temperatura se mantém constante.

Após o procedimento 1, a pressão dentro do balão A será ☐ menor. ☐ igual. ☐ maior.

4. Compare, agora, o estado de equilíbrio do sistema após a realização desses dois procedimentos.

Assinalando com um **X** a quadrícula correspondente, **INDIQUE** se a pressão, dentro do balão **B**, após a realização do procedimento **2**, será **menor**, **igual** ou **maior** que a pressão dentro do balão **A**, após a realização do procedimento **1**.

Considere que a temperatura, nos dois balões, se mantém constante e que, no balão **A**, continua a haver I_2 (s).

JUSTIFIQUE sua resposta.

Após o procedimento **2**, a pressão no interior do balão **B** será ☐ menor. ☐ igual. ☐ maior.

Justificativa



QUESTÃO 03

O metano, CH_4 , principal constituinte do gás natural, é um combustível conhecido. Um segundo composto também empregado como combustível é o nitrometano, CH_3NO_2 , que é utilizado em certos carros de corrida e em aeromodelos.

Analise a equação balanceada que representa a combustão completa de cada um desses combustíveis:



1. Uma característica importante de um combustível está relacionada à capacidade de os produtos de sua queima exercerem pressão sobre o pistão de um cilindro do motor.

Isso pode ser avaliado por meio de um quociente Q , que se obtém aplicando-se esta fórmula:

$$Q = \frac{\text{Quantidade em mols de produtos gasosos}}{\text{Quantidade em mols de reagentes gasosos}}$$

Considerando-se as equações acima representadas, **CALCULE** o valor de Q para a combustão do metano e do nitrometano.

(Deixe seus cálculos indicados, evidenciando, assim, seu raciocínio.)

Cálculo (metano):	Cálculo (nitrometano):

2. Outra característica de um combustível, também importante, é a sua entalpia de combustão, $\Delta H^\ominus$.

Neste quadro, estão indicados os valores de $\Delta H^\ominus$ de formação de alguns compostos na mesma temperatura:


Composto	$\Delta H^\ominus$ de formação / (kJ/mol)
Nitrometano, $\text{CH}_3\text{NO}_2(\text{g})$	– 75
Dióxido de carbono, $\text{CO}_2(\text{g})$	– 394
Água, $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$	– 242

Considerando esses valores de $\Delta H^\ominus$ de formação, **CALCULE** o $\Delta H^\ominus$ de combustão de 1 mol de nitrometano gasoso.

(Deixe seus cálculos indicados, evidenciando, assim, seu raciocínio.)

QUESTÃO 04

Um grupo de estudantes foi encarregado de investigar a reação do brometo de *ter*-butila (composto I) com uma solução aquosa de hidróxido de sódio, que resulta na formação de álcool *ter*-butilico (composto II) como representado nesta equação:



Para isso, eles realizaram cinco experimentos, nas condições indicadas neste quadro:

Experimento	Concentração / (mol/L)		Velocidade / mol / (L · s)
	$(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{Br}$	OH^-	
1	0,10	0,10	1×10^{-3}
2	0,20	0,10	2×10^{-3}
3	0,30	0,10	3×10^{-3}
4	0,10	0,20	1×10^{-3}
5	0,10	0,30	1×10^{-3}

1. **Assinalando** com um **X** a quadrícula correspondente, **INDIQUE** se a velocidade da reação depende apenas da concentração do brometo de *ter*-butila, apenas da concentração do íon hidróxido ou de ambas as concentrações.



A velocidade da reação depende da concentração de

☐ $(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{Br}$
☐ OH^-
☐ $(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{Br}$ e OH^-

2. O mecanismo proposto para essa reação envolve duas etapas – a primeira mais lenta que a segunda:



Analise estes diagramas, em que se apresenta a energia do **sistema inicial**, $[(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{Br} + \text{OH}^-]$, do **sistema intermediário**, $[(\text{CH}_3)_3\text{C}^+ + \text{OH}^- + \text{Br}^-]$, e do **sistema final**, $[(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{OH} + \text{Br}^-]$:



Considere a velocidade relativa das duas etapas dessa reação.


- A) **Assinalando** com um **X** a quadrícula correspondente, **INDIQUE** qual dos diagramas – **I** ou **II** – representa **corretamente** a energia de ativação das **duas** etapas.
- B) **INDIQUE**, por meio de **setas**, diretamente no diagrama que você indicou como o **correto**, a energia de ativação das **duas** etapas.

JUSTIFIQUE sua resposta.

O diagrama correto é o	☐ I.	☐ II.
Justificativa		

QUESTÃO 05

1. O ácido málico pode ser convertido em ácido succínico por meio de duas reações consecutivas — uma de eliminação de água e outra de hidrogenação —, como representado neste esquema:




O composto **X**, obtido após a reação de desidratação do ácido málico, apresenta dois estereoisômeros.

REPRESENTE a fórmula estrutural de **cada um** desses **dois** estereoisômeros.

(Deixe bem explícitas as diferenças entre eles.)

Estereoisômero I	Estereoisômero II

2. Por sua vez, o ácido succínico pode ser convertido em anidrido succínico, por meio de uma reação de desidratação, catalisada por ácido sulfúrico, como mostrado neste esquema:



Uma reação análoga pode ser realizada com apenas **um** dos estereoisômeros do composto **X**, representados no item 1 desta questão. O outro estereoisômero desse composto **não** reage nas mesmas condições.

Considerando as estruturas propostas no item 1 desta questão, **INDIQUE** qual dos dois estereoisômeros do composto **X – I** ou **II** – pode produzir um anidrido em reação análoga à descrita para o ácido succínico.

JUSTIFIQUE sua resposta.

Indicação
Justificativa



QUESTÃO 06

1. A água oxigenada, H_2O_2 , participa, como um dos reagentes, de muitas reações de oxirredução.

A) **ESCREVA** os coeficientes estequiométricos na frente de **cada uma** das espécies que participam das reações indicadas pelas equações químicas **I** e **II**, de modo que fiquem balanceadas.

B) **INDIQUE**, em cada caso, se o H_2O_2 atua como agente **oxidante** ou **redutor**.

Balanceamento da equação I : $\text{___ H}_2\text{O}_2 + \text{___ I}^- + \text{___ H}^+ \rightarrow \text{___ H}_2\text{O} + \text{___ I}_2$	Indicação
Balanceamento da equação II : $\text{___ MnO}_4^- + \text{___ H}_2\text{O}_2 + \text{___ H}^+ \rightarrow \text{___ Mn}^{2+} + \text{___ H}_2\text{O} + \text{___ O}_2$	Indicação

2. A água oxigenada decompõe-se, como mostrado nesta equação:



REPRESENTE, por **equações balanceadas**, a semi-reação de **oxidação** e a semi-reação de **redução** da reação de decomposição da água oxigenada, em meio ácido, envolvendo H^+ (aq).

Semi-reação de oxidação
Semi-reação de redução

3. Sabe-se que a decomposição da água oxigenada, como representado na equação no item 2 desta questão, é espontânea.

Assinalando com um **X** a quadrícula correspondente, **INDIQUE** se a força eletromotriz dessa reação é **menor**, **igual** ou **maior** que zero.


JUSTIFIQUE sua resposta.

A força eletromotriz é	☐ menor que zero.	☐ igual a zero.	☐ maior que zero.
Justificativa			


QUESTÃO 07

A produção de biodiesel, por reação de transesterificação de óleos vegetais, tem sido realizada por meio da reação desses óleos com metanol em excesso. Como resultado, obtém-se uma mistura de glicerina, metanol e ésteres de diversos ácidos graxos. Esses ésteres constituem o biodiesel.


Analise a fórmula estrutural de cada uma destas três substâncias:



Glicerina



Ricinoleato de metila
(um constituinte típico do biodiesel)



Metanol

Analise, agora, este quadro:


Substância	Massa molar / (g/mol)	Temperatura de ebulição / °C
I. Glicerina	92	290
II. Ricinoleato de metila	312	227
III. Metanol	32	64

1. Considerando as três substâncias puras – **I, II e III** – relacionadas nesse quadro, **ORDENE**-as segundo a **ordem crescente** da intensidade das suas interações intermoleculares.

2. Na transesterificação, como o metanol é adicionado em excesso, formam-se duas fases – uma rica em metanol e uma rica em biodiesel. A glicerina distribui-se entre essas duas fases, predominando, porém, na fase alcoólica.

Considerando as interações intermoleculares entre os pares **glicerina/metanol** e **glicerina/biodiesel**, **JUSTIFIQUE** essa predominância da glicerina na fase alcoólica.






Questões desta prova podem ser reproduzidas para uso pedagógico, sem fins lucrativos, desde que seja mencionada a fonte: **Vestibular 2008 UFMG**.
Reproduções de outra natureza devem ser autorizadas pela Copeve/UFMG.

Cursos que Indicamos

Conheça os cursos e dê o próximo passo na sua preparação.

Clique na imagem ou no botão para acessar.



Código Matemática 2.0

Conhecer o curso



Curso Preparatório ENEM

Conhecer o curso



Curso Preparatório Redação ENEM

Conhecer o curso

