
PROVA DE QUÍMICA

QUESTÃO 26

A reação espontânea $3\text{Ag}_2\text{S}_{(s)} + 2\text{Al}_{(s)} \rightarrow 6\text{Ag}_{(s)} + 2\text{Al}^{3+} + 3\text{S}_{(aq)}^{2-}$ representa o processo de limpeza de objetos de prata, recobertos por uma camada fina de sulfeto de prata. É **CORRETO** afirmar que:

- a) o sulfeto de prata sofre oxidação durante a reação.
- b) o alumínio metálico é oxidado de 0 para + 2.
- c) 6 elétrons participam da reação.
- d) a diferença de potencial elétrica dessa reação é negativa.

QUESTÃO 27

O que acontece quando um fio de zinco é mergulhado numa solução aquosa de sulfato de cobre?

- a) O cobre se oxida.
- b) Bolhas de ar são liberadas.
- c) O pH da solução aumenta.
- d) Uma camada de cobre recobre o fio.

$$\begin{aligned} E^0 (\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) &= +0,34 \text{ V} \\ E^0 (\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) &= -0,76 \text{ V} \end{aligned}$$

QUESTÃO 28

Considere as seguintes soluções aquosas, a 25°C e 1 atm:

- X – 0,25 mol/L de sacarose ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$)
- Y – 0,50 mol/L de cloreto de sódio (NaCl)
- Z – 0,50 mol/L de sulfato de potássio (K_2SO_4)

Considerando-se as propriedades coligativas de tais soluções, é **CORRETO** afirmar que:

- a) a solução X é a de maior pressão de vapor.
- b) a solução Y tem temperatura de solidificação menor do que a solução Z.
- c) as três soluções apresentam temperatura de congelamento superior a 0°C.
- d) a ordem crescente de temperatura de ebulição dessas soluções é: $Z < Y < X$.

QUESTÃO 29

O medicamento **SONRISAL**, utilizado como antiácido estomacal, contém em sua formulação, por comprimido, 840 mg de bicarbonato de sódio (NaHCO_3).

Sabe-se que o suco gástrico é formado por uma solução de ácido clorídrico de concentração igual a $0,2 \text{ mol/L}$. Quando se ingere um comprimido de **SONRISAL**, ocorre a reação de neutralização completa entre o bicarbonato e o suco gástrico, produzindo cloreto de sódio, gás carbônico e água.

Considerando essas informações, assinale o volume, em mL, de suco gástrico neutralizado pela ingestão de um comprimido de **SONRISAL**.

- a) 50,0
- b) 100,0
- c) 150,0
- d) 500,0


QUESTÃO 30

Uma solução de hidróxido de magnésio, utilizada no combate à acidez estomacal, apresenta uma concentração igual a $2,9 \% \text{ p/V}$. Assinale a concentração de íons hidróxido em mol.L^{-1} nessa solução.

- a) 0,05
- b) 0,10
- c) 0,50
- d) 1,00

QUESTÃO 31

A fluorita é um minério de fluoreto de cálcio (CaF_2), substância utilizada na obtenção do ácido fluorídrico (HF), mediante reação com uma solução de ácido sulfúrico, de acordo com a seguinte equação não balanceada:



Sabe-se que, quando $15,6 \text{ g}$ do minério de fluorita reagem com certa quantidade de solução de ácido sulfúrico, produzem-se $6,0 \text{ g}$ de ácido fluorídrico. Assinale o grau de pureza do minério fluorita em termos de fluoreto de cálcio.

- a) 25%
- b) 50%
- c) 75%
- d) 90%

QUESTÃO 32

Considere as transformações abaixo:

- I . Congelação da água.
- II . Vaporização da água.
- III . Fusão do gelo.
- IV . Condensação do vapor de água.

São transformações que liberam calor:

- a) I e II
- b) I e IV
- c) III e IV
- d) II e III

QUESTÃO 33


Considere o equilíbrio entre carbonato de cálcio, óxido de cálcio e dióxido de oxigênio: $\text{CaCO}_{3(s)} \rightleftharpoons \text{CO}_{2(g)} + \text{CaO}_{(s)}$

Em determinadas condições, a constante desse equilíbrio é 0,10. Assinale a opção que poderia levar a um aumento dessa constante de equilíbrio.

- a) Mudança de pressão.
- b) Adição de um catalisador.
- c) Mudança de temperatura.
- d) Mudança da pressão parcial de $\text{CO}_{2(g)}$.

QUESTÃO 34

A reação da substância X com a substância Y é representada através do modelo:




Assinale a equação química balanceada que melhor representa a reação entre as substâncias X e Y.

- a) $2 X + Y_2 \rightarrow 2 XY$
- b) $3 X + 2 Y_2 \rightarrow 3 XY + Y_2$
- c) $6 X + 4 Y_2 \rightarrow 6 XY + Y_2$
- d) $3 X + 2 Y_2 \rightarrow 3 XY + \frac{1}{2} Y_2$

QUESTÃO 35

O estimulante cardíaco e respiratório **metamivam** tem a seguinte fórmula estrutural:



Considerando-se a estrutura desse composto, é **INCORRETO** afirmar que ele:

- a) apresenta carbonos com hibridização sp^2 e sp^3 .
- b) apresenta os grupos funcionais: álcool, éter e amina.
- c) é um composto aromático.
- d) apresenta fórmula molecular igual a $C_{13}H_{19}O_3N$.

Cursos que Indicamos

Conheça os cursos e dê o próximo passo na sua preparação.

Clique na imagem ou no botão para acessar.



Código Matemática 2.0

Conhecer o curso



Curso Preparatório ENEM

Conhecer o curso



Curso Preparatório Redação ENEM

Conhecer o curso

