

MEDICINA
QUESTÕES DISCURSIVAS

Questão 37

- a) Pode-se cuidar: aliviar o sofrimento (ansiedade, depressão, dor e falta de ar), oferecer apoio psicológico, social e espiritual buscando melhora da qualidade de vida, oferecendo cuidado paliativo. (valor: 2,0 pontos)
- b) Fonoaudiólogo, médico ou nutricionista. (valor: 2,0 pontos)
- c) Gastrostomia endoscópica. (valor: 2,0 pontos)
- d) Opiáceo, associado ou não a antiinflamatórios não hormonais e adjuvantes. (valor: 2,0 pontos)
- e) O atestado de óbito deve ser emitido pelo médico assistente ou substituto, em domicílio. (causa de óbito bem definida). (valor: 2,0 pontos)

Questão 38

- a) Corticóide. Via inalatória. Período: de semanas a meses, reduzindo 25% a cada 2 meses até um bom controle da asma. Utilizar o menor número possível de doses ao dia (melhor aderência) e a menor dose diária total. (valor: 4,0 pontos)
- b) Rinite, sinusite, rinossinutite e refluxo gastroesofágico (valor: 4,0 pontos)
- c) Vacinação anual contra influenza. Indicação de corticóide. (valor: 2,0 pontos)

Questão 39

- a) Menopausa tardia; menarca precoce (longo período de exposição aos estrogênios endógenos); terapêutica de reposição hormonal por mais de 5 anos; primeiro parto tardio (após os 30 anos); falta de aleitamento materno; baixo número de gestações a termo; sexo feminino; idade. (valor: 5,0 pontos)
- b) Mamografia. (valor: 2,0 pontos)
- c) Conduta inadequada, pois clinicamente o nódulo tem características benignas. Por isso, não se recomendaria a interrupção imediata da terapêutica de reposição hormonal que possivelmente causaria sintomas menopausais. Além disso, o médico poderia estar causando grandes preocupações desnecessárias na paciente. Recomenda-se sempre a avaliação do nódulo por método de imagem, antes de fazer uma análise citopatológica ou histopatológica. (valor: 3,0 pontos)

Questão 40

- a) Diagnóstico sintomático: abdome agudo obstrutivo. Etiologia: hérnia inguinal encarcerada. (valor: 3,0 pontos)
- b) Características da dor abdominal, antecedentes de cirurgia abdominal e hábito intestinal. (valor: 3,0 pontos)
- c) Presentes e aumentados; eventualmente, de timbre metálico. (valor: 1,0 ponto)
- d) Acesso venoso. Passagem de sondasogástrica. Reposição de volume. Analgesia. Exames gerais pré-operatórios, com correção de possíveis distúrbios de eletrólitos. Cirurgia para correção da hérnia inguinal. Não é aceitável: reduzir a hérnia e dispensar o paciente. (valor: 3,0 pontos)

Cursos que Indicamos

Conheça os cursos e dê o próximo passo na sua preparação.

Clique na imagem ou no botão para acessar.



Código Matemática 2.0

Conhecer o curso



Curso Preparatório ENEM

Conhecer o curso



Curso Preparatório Redação ENEM

Conhecer o curso

