-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

Questão 21

Uma médica de 35 anos de idade, com histórico de dois episódios depressivos ao longo da vida, relatou que, há dois meses, vinha apresentando quadro de cansaço intenso descrito por "prostração profunda", tristeza, perda de peso, prejuízo na atenção e concentração, insônia terminal e piora dos sintomas no período matutino. Contou que, nas últimas semanas desse episódio, passou a faltar aos seus plantões, algo que jamais acontecera em seu histórico laboral. Após consulta com psiquiatra, foi diagnosticada com transtorno depressivo maior com características melancólicas e iniciou uso de venlafaxina XR 150 mg pela manhã. Um mês depois, retornou ao psiquiatra. Enquanto aguardava na sala de espera, sorridente, conversava com as pessoas e fazia piadas com o secretário, embora não tivesse intimidade com ele. Ao entrar no consultório, abraçou o psiquiatra e lhe deu um beijo no rosto, agradecendo-o pela "pílula da felicidade". Informou que, nas últimas três semanas, "estava feliz como nunca havia se sentido em toda a sua vida, namorando dois colegas do hospital e com disposição para namorar mais", dormia apenas 4 horas por dia, mas acordava disposta e mantinha suas atividades laborativas das 7 às 21 horas. Diante da situação, o psiquiatra optou pela suspensão da venlafaxina e agendou uma reavaliação para duas semanas. A paciente retornou ao consultório após um mês, sem medicação, sem qualquer alteração em relação à última avaliação.

A respeito desse caso clínico, assinale a opção correta.

- **A** Os antipsicóticos atípicos, aripiprazol, lurasidona, olanzapina, quetiapina, risperidona e ziprasidona, apresentam efeitos antimaníacos e estão aprovados pelo *U. S. Food and Drug Administration* para o tratamento da mania aguda.
- **B** Se comparados a indivíduos com transtorno bipolar tipo I, os indivíduos com transtorno bipolar tipo II apresentam menor cronicidade da doença e passam menos tempo na fase depressiva.
- **C** O transtorno bipolar tipo II é considerado uma forma mais leve do transtorno bipolar, uma vez que o paciente não chega a fazer um quadro de mania, cursando com pouco prejuízo funcional e laboral.
- **D** O transtorno ciclotímico é caracterizado pela constante alternância entre um episódio depressivo maior e um episódio de mania ou hipomania.
- **E** O valproato e o lítio são opções terapêuticas eficazes para o caso em questão.

Questão 22

Uma paciente de 59 anos de idade, com histórico de fibromialgia, diagnosticada com câncer de mama, foi submetida a cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Foram identificadas células cancerosas por meio de receptores positivos para estrogênio e progesterona. A paciente iniciou hormonioterapia com tamoxifeno. Cinco meses após o procedimento cirúrgico, a paciente passou a apresentar piora do quadro de dor crônica e prejuízo funcional acentuado nas atividades laborativas, com relatos de tristeza na maioria dos dias, perda do interesse pelas coisas que antes lhe despertava prazer, fadiga intensa, insônia, baixa autoestima associada a sentimentos de culpa e redução da capacidade de concentrar-se. Dois meses depois, com o agravamento dos sintomas, durante internação na unidade de oncologia, foi solicitado parecer para a psiquiatria. Os exames bioquímicos estavam dentro dos limites da normalidade.

Considerando o quadro clínico descrito e o perfil de interação medicamentosa, assinale a opção que apresenta o tratamento adequado nesse caso.

- **A** fluoxetina associada à pregabalina
- **B** desvenlafaxina associada à psicoterapia
- **C** pregabalina associada à psicoterapia
- **D** gabapentina associada à psicoterapia
- **E** paroxetina associada à gabapentina

Questão 23

Os quadros ansiosos representam os transtornos mentais mais comuns na atualidade. O jornal **O Estado de S. Paulo** publicou, no dia 05 de junho de 2019, uma matéria na qual cita um dado alarmante da Organização Mundial de Saúde (OMS): o Brasil tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo; um total de 18,6 milhões de brasileiros (9,3% da população) convivem com um transtorno de ansiedade.

Sobre os quadros de ansiedade, assinale a opção correta.

- **A** A ansiedade é considerada apenas um transtorno mental e, como tal, exige tratamento medicamentoso e/ou psicoterápico.
- **B** A prevalência dos transtornos de ansiedade é maior entre os homens.
- **C** Os tratamentos mais eficazes para o transtorno de pânico são a farmacoterapia e a terapia cognitivo- comportamental. Entre as diferentes classes de medicamentos, os Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina (ISRS) são eficientes para o transtorno de pânico.
- **D** A terapia cognitivo-comportamental consiste no tratamento padrão ouro para o transtorno de ansiedade generalizada e baseia-se na aplicação de técnicas de associação livre, transferência e contratransferência.
- **E** Os Inibidores de Receptação da Serotonina e Noradrenalina são o tratamento de escolha para as fobias.

Questão 24

Acerca da saúde do idoso, julgue os itens a seguir.

I Nos idosos, o transtorno depressivo maior é mais frequente que na população geral, manifestando-se habitualmente por meio de queixas somáticas. Na população geriátrica, os quadros depressivos são mais facilmente reconhecidos, sobretudo pelos clínicos gerais na atenção primária.

II O risco de suicídio entre a população idosa é superior a esse tipo de risco entre a população geral.

III A demência vascular é prevalente entre os homens, e, neles, os sintomas neurológicos focais são mais frequentes quando comparados com os da demência do tipo Alzheimer.

IV Os transtornos psiquiátricos refratários e as comorbidades clínicas prevalecem na população idosa, portanto, considerando-se as alterações na sensibilidade do órgão final ou sítio receptor das medicações, em idosos, recomenda-se, como regra geral, o uso de doses maiores das medicações psicotrópicas.

V Achado na ressonância nuclear magnética de atrofia do lobo temporomedial é característica da demência vascular.

Estão certos apenas os itens

A I, II e III.
B I, III e V.
C I, IV e V.
D II e III.
E II e IV.

Questão 25

Considerando os aspectos psiquiátricos que envolvem a saúde da mulher e o seu ciclo reprodutivo, assinale a opção correta.

A A incidência de depressão na mulher está intimamente associada às alterações de estrogênio ao longo da vida, e é maior após a menopausa.
B Entre os tratamentos para os casos de *baby blues*, a sertralina é considerada uma opção de primeira linha.
C O uso do lítio na gravidez está associado principalmente a malformações do sistema nervoso central.
D A eletroconvulsoterapia é contraindicada na gravidez devido ao risco de indução de parto prematuro.
E Independentemente da presença de sintomas depressivos em mulheres na perimenopausa, a desvenlafaxina apresenta eficácia na redução dos sintomas vasomotores dessas mulheres.

Questão 26

Considerando o que prescreve o **Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal**, assinale a opção correta com relação a perícias médicas e alienação mental.

A Transtornos de personalidade são passíveis de serem considerados como uma das causas de alienação mental.
B Considera-se como alienação mental um caso de transtorno neurótico que não entre em remissão após anos de tratamento medicamentoso e psicoterápico.
C Um servidor com esquizofrenia residual é passível de ser enquadrado como alienado mental.
D Na condição de assistente técnico ou perito, o médico pode intervir nos atos de outro médico, fazendo apreciação em presença do examinado.
E Retardo mental moderado é considerado como alienação mental.

Questão 27

Um homem de 75 anos de idade foi diagnosticado com doença de Parkinson há dois anos. Desde então, estava em uso diário de L-dopa/carbidopa 250 mg/25 mg e pramipexol 0,75 mg, ambos três vezes ao dia, evoluindo com melhora moderada dos sintomas motores. Há três meses, conforme relatos da esposa, passou a ficar mais isolado, recusando convites sociais dos amigos e familiares, com queixa de fadiga e prejuízo na memória recente — por vezes esquecia-se de pagar contas e de onde havia deixado sua carteira. Ele teve redução do apetite com perda ponderal superior a 10% do peso prévio, dificuldade em iniciar e manter o sono, e perda do interesse pelas atividades de prazer. Na última semana, evoluiu com alteração do nível de consciência e agitação psicomotora, sendo internado no pronto socorro da clínica médica.

Com referência ao caso clínico apresentado, assinale a opção correta.

A Embora a doença de Parkinson não esteja associada com aumento da prevalência do transtorno depressivo maior, os quadros de depressão resistente são mais comuns nessa população.
B A risperidona é o neuroléptico de escolha para tratamento de psicose em pacientes com doença de Parkinson.
C Os agentes antiparkinsonianos são causas frequentes de *delirium* em idosos.
D A doença de Parkinson, por acometer os gânglios da base, apresenta como protótipo de sintomas as manifestações motoras, e, ao contrário da pseudodemência causada por depressão em idosos, não causa prejuízo mensurável das capacidades cognitivas.
E O uso do pramipexol está associado ao desenvolvimento de quadros depressivos em idosos com doença de Parkinson.

Questão 28

Sobre os transtornos de personalidade, assinale a opção correta.

A Indivíduos com transtorno de personalidade paranoide apresentam comportamentos excêntricos perceptíveis até mesmo para leigos; pensamento mágico, ideias de referência e desrealização são típicos.
B Pessoas com transtornos de personalidade, devido ao padrão, persistem em experiência interna que desvia acentuadamente do padrão cultural no qual estão inseridas, vivenciam sofrimento e prejuízo funcional significativos e, por serem egodistônicas, têm maior propensão para aceitar auxílio psiquiátrico.
C Ladrões, estelionatários ou traficantes de drogas cujo comportamento criminoso é direcionado para ganho pessoal devem receber o diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial.
D A característica essencial do transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva é a presença de sintomas como pensamentos intrusivos, rituais e compulsões.
E Sentimento crônico de vazio é uma característica presente no transtorno de personalidade *borderline*; pacientes com esse transtorno não toleram o abandono e envolvem-se em uma incessante busca por companhia, sem se importarem com o quanto ela lhe seja insatisfatória.

Questão 29

As medicações antipsicóticas atuam em vias dopaminérgicas e serotoninérgicas. Acerca dessas medicações e vias, assinale a opção correta.

- A A via dopaminérgica nigroestriatal está predominantemente associada aos efeitos neuro-hormonais.
- B A via dopaminérgica tuberoinfundibular está predominantemente associada a distúrbios de movimento.
- C O bloqueio somatodendrítico dos receptores 5HT1 A estimula o aumento da liberação de dopamina.
- D A via dopaminérgica mesolímbica está predominantemente associada aos sintomas negativos da esquizofrenia.
- E O 5HT modula a liberação cortical de glutamato.

Questão 30

Várias medicações, psiquiátricas ou não, podem aumentar o intervalo QT no eletrocardiograma, o que representa um risco real à vida. Considerando as doses terapêuticas e comparando o potencial das drogas psiquiátricas no aumento do QT, assinale a opção correta.

- A Olanzapina aumenta mais o QT do que a Clorpromazina.
- B Tioridazina aumenta mais o QT do que a Ziprasidona.
- C Quetiapina aumenta mais o QT do que a Ziprasidona.
- D Olanzapina aumenta mais o QT do que a Tioridazina.
- E Olanzapina aumenta mais o QT do que a Ziprazidona.

Questão 31

A respeito do tratamento farmacológico das principais doenças psiquiátricas, assinale a opção correta.

- A O tratamento dos transtornos de ansiedade deve continuar por um período de 3 a 6 meses após a remissão do quadro.
- B Segundo os protocolos em vigor, entre eles o CANMAT, o lítio, o divalproato e a carbamazepina são a opção de primeira linha em monoterapia para o tratamento da fase de mania do transtorno bipolar.
- C Para o tratamento do transtorno de pânico, a paroxetina tem efeito sedativo e tende a acalmar os pacientes de imediato, o que leva a maior adesão e menos interrupção do tratamento.
- D O exame de urina para detecção de benzodiazepínico é um parâmetro de monitoramento eficaz para confirmar se, após o terceiro dia do término do uso desse medicamento, o organismo do paciente se encontra desintoxicado.
- E Segundo os protocolos vigentes, entre eles o CANMAT, a eletroconvulsoterapia é o tratamento de primeira linha para a fase de mania do transtorno bipolar.

Questão 32

Em relação aos conceitos básicos da psicanálise, assinale a opção correta.

- A A hipótese estrutural criada por Freud envolve o consciente, o inconsciente e o pré-consciente.
- B O modelo topográfico da mente criado por Freud envolve Ego, Superego e Id.
- C Segundo a psicanálise Freudiana, traços de personalidade estariam associados a uma fixação a estágios psicossexuais de fases do desenvolvimento.
- D O chamado superego auxiliar funciona como uma ferramenta intrapsíquica de auxílio ao superego em casos de uma forte atuação do Id.
- E Na relação entre médico e paciente, a transferência é um aspecto positivo, ao passo que a contratransferência é um aspecto negativo.

Questão 33

No que se refere às emergências psiquiátricas e ao suicídio, assinale a opção correta.

- A Mais de 30% dos pacientes esquizofrênicos morrem por suicídio.
- B Um comportamento preditor de violência iminente é o do paciente que fica sentado, olhando atentamente, hipervígil.
- C Pacientes com comportamento agressivo que compareçam ao atendimento médico, tanto de uma unidade com poucos recursos quanto de um grande hospital, devem ser submetidos à administração de benzodiazepínico por via endovenosa.
- D Em comparação com pessoas que morrem de morte natural, indivíduos que cometeram suicídio tendem a apresentar níveis mais baixos de ácido hidroxiindolacético.
- E A prometazina é a primeira opção para o tratamento da distonia aguda induzida por neurolépticos.

Questão 34

Quanto à eletroconvulsoterapia, assinale a opção correta.

- A Os protocolos mais utilizados de ECT no tratamento da depressão consistem em sessões diárias por 2 semanas.
- B Pacientes idosos com depressão têm probabilidade de apresentar resposta clínica mais significativa que a de pacientes jovens na mesma situação.
- C Na depressão, a presença de sintomas melancólicos é considerada um dos piores preditores de resposta à eletroconvulsoterapia.
- D O posicionamento de eletrodo unilateral direto apresenta maior resposta clínica.
- E Para o ECT bilateral, a carga utilizada deve ser de 0,5 a 1 vez o limiar convulsígeno.

Questão 35

É sintoma positivo de esquizofrenia

- A o empobrecimento do pensamento.
- B a diminuição da motivação.
- C o isolamento social.
- D o embotamento afetivo.
- E a alucinação.

Questão 36

O *delirium*, síndrome clínica que representa importante marcador de risco à vida, está associado a maiores tempo e custo de internação. Considerando os exames a serem solicitados no rastreio laboratorial inicial dessa síndrome, julgue os itens a seguir.

I Solicitar hemograma completo é necessário e suficiente para o rastreio e a confirmação da referida síndrome.

II Solicitar dosagem de eletrólitos, tais como sódio e potássio, além de hemograma completo é o indicado, visto que o resultado desses exames determinarão a presença ou não da síndrome.

III A dosagem de proteína amiloide se inclui entre os exames a serem solicitados para constatação de *delirium*.

Assinale a opção correta.

- A Apenas o item I está certo.
- B Apenas o item II está certo.
- C Apenas os itens I e III estão certos.
- D Apenas os itens II e III estão certos.
- E Todos os itens estão certos.

Questão 37

Depressão é o transtorno mental mais frequente no período perinatal, podendo atingir de 10 a 15% das mulheres. A respeito da depressão perinatal, julgue os itens a seguir.

I A gestação é um período de vulnerabilidade para o aparecimento de transtornos de humor.
II O sexo feminino é mais vulnerável a transtornos de humor no período fértil.
III O não planejamento da gestação não constitui fator social e psicológico que interfira no aparecimento desse transtorno.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo.
B Apenas o item III está certo.
C Apenas os itens I e II estão certos.
D Apenas os itens II e III estão certos.
E Todos os itens estão certos.

Questão 38

Prescrever ou não medicamentos psicotrópicos durante a amamentação é uma decisão complexa, devendo-se sempre levar em consideração a relação risco-benefício. O psicofármaco que oferece maior risco quando prescrito durante o período de amamentação é o

A ácido valproico.
B cloridrato de paroxetina.
C carbonato de lítio.
D alprazolam.
E cloridrato de sertralina.

Questão 39

O álcool é um depressor do SNC. A intoxicação alcoólica aguda é um evento autolimitado e sua manifestação depende do nível sérico de álcool. Acerca do quadro de intoxicação alcoólica aguda bem como da abordagem de paciente que o apresente, assinale a opção correta.

A É necessária a administração de glicose hipertônica endovenosa em todos os pacientes intoxicados.
B Se o paciente estiver agitado, deve-se recomendar a administração de benzodiazepínicos.
C A encefalopatia de Wernicke é identificada pela tríade clássica: amnésia anterógrada, confabulação e mioclonia.
D Quando necessária a administração de glicose hipertônica endovenosa ao paciente, deve-se antes aplicar tiamina 300 mg intramuscular.
E Em caso de agitação, o uso de antipsicóticos, como haloperidol 5 mg, intramuscular é contraindicado.

Questão 40

Em relação à avaliação psiquiátrica de crianças e adolescentes, é correto afirmar que

A a entrevista com a criança é desnecessária, uma vez que os pais são os melhores informantes sobre a sintomatologia da criança.
B os sintomas apresentados pela criança e pelo adolescente são pouco influenciados pelo ambiente familiar.
C a avaliação psiquiátrica na infância é autossuficiente e dispensa atendimento interdisciplinar.
D o sigilo entre o médico e o adolescente pode ser quebrado nos casos em que o vínculo entre o médico e os pais/responsáveis precise ser fortalecido.
E ocorrem comumente, no desenvolvimento normal da criança, sintomas que nem sempre significam a presença de transtornos mentais.

Questão 41

A respeito de abuso sexual infantil, julgue os itens a seguir.

I Geralmente o abuso sexual intrafamiliar é cometido por alguém conhecido e próximo da criança, em uma estrutura de poder assimétrica.
II Quando a criança revela o abuso e a família demonstra credibilidade ao relato da criança e assume estratégias para protegê-la, ela se sente mais vulnerável, podendo desenvolver problemas tais como isolamento social, depressão, pensamentos e tentativas de suicídio, ansiedade entre outros.
III Brincadeiras sexualizadas, temas sexuais em desenhos, histórias e jogos, comportamentos regressivos, como urinar na cama, chupar o dedo, ou dependência dos pais e(ou) responsáveis em atividades em que já havia conquistado autonomia há muito tempo, são alguns dos efeitos comportamentais observados em crianças vítimas de abuso sexual.
IV Só se considera abuso sexual em meninas se for verificado, em exame pericial, o rompimento do hímen.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item III está certo.
B Apenas os itens I e III estão certos.
C Apenas os itens I, II e III estão certos.
D Apenas os itens I, II e IV estão certos.
E Todos os itens estão certos.

Questão 42

Na abordagem do paciente com transtornos relacionados ao uso de drogas psicoativas, o médico deve

A avaliar diagnósticos comórbidos e tratá-los adequadamente.
B manter uma forma empática na conversa, mas adotar uma postura de julgamento moral em relação ao uso de drogas.
C seguir um protocolo de tratamento padrão não individualizado para o paciente.
D prescrever o uso isolado de medicamentos que se mostram mais eficazes no tratamento desses transtornos.
E dar preferência ao uso de benzodiazepínicos, uma vez que possuem baixo potencial de dependência.

Questão 43

A automutilação está mais comumente associada ao transtorno de personalidade do tipo

A esquizoide.
B dependente.
C narcisista.
D histriônica.
E *borderline*.

Questão 44

Uma paciente de 19 anos de idade é levada ao consultório pelos pais com histórico de perda progressiva de peso. Ela mede 153 cm de altura e pesa 29 kg. Narra que havia perdido peso fazendo dietas e que gostaria de emagrecer mais por ainda estar se sentindo gorda. Os pais relatam uma grande redução da ingesta alimentar associada a expressivo aumento de atividade física nos últimos 8 meses. Informam ainda que a menstruação da filha não ocorreu nos últimos 3 meses.

A partir desse caso clínico, o procedimento de urgência a ser realizado em relação à paciente é

A tomografia computadorizada de crânio.
B estudo do esvaziamento gástrico.
C exame dos níveis séricos de colesterol (perfil lipídico).
D exame do nível sérico de potássio.
E densitometria óssea.

Questão 45

Em relação aos transtornos conversivos, é correto afirmar que

A incluem sintomas físicos, múltiplos, recorrentes e variáveis no tempo.
B envolvem sintomas neurológicos.
C limitam-se a uma disfunção sexual.
D se produzem sintomas intencionalmente.
E predominam sintomas como dores persistentes, intensas e angustiantes.

Questão 46

Um paciente de 43 anos de idade comparece ao atendimento médico afirmando estar certo de que tem câncer. Relata pensar que o câncer ainda não foi encontrado e estar convencido de que há um tumor no seu corpo. O paciente continua convencido de que tem câncer, apesar de todos os exames não mostrarem alterações e da orientação dos médicos dizendo o contrário.

Nesse caso, o diagnóstico mais provável para o paciente é de

A transtorno de somatização (síndrome de Briquet).
B transtorno dismórfico corporal.
C transtorno dissociativo.
D transtorno hipocondríaco.
E transtorno neurovegetativo somatoforme.

Questão 47

Pessoas com depressão atípica muitas vezes tiveram o primeiro episódio depressivo em uma idade precoce, geralmente durante a adolescência. Um dos sintomas característicos da depressão atípica é

A o estupor depressivo.
B o aumento da sensibilidade à rejeição interpessoal.
C a redução do apetite.
D o humor pouco reativo.
E a redução do sono.

Questão 48

Uma paciente de 29 anos de idade, dona de casa, comparece ao consultório com queixas de intensa dificuldade em relação às obrigações sociais da escola da filha. Diz que evitar participar das reuniões de pais e de festas e relata um grande medo de se comportar de forma embaraçosa, de se sentir humilhada e rejeitada nessas ocasiões. Informa, também, sentir grande ansiedade todas as vezes que tem que encontrar pessoas que não conhece bem.

Considerando a situação descrita, assinale a opção que corresponde ao transtorno de personalidade com diagnóstico diferencial para esse quadro clínico.

A transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva
B transtorno de personalidade *borderline*
C transtorno de personalidade evitativa
D transtorno de personalidade narcisista
E transtorno de personalidade dependente

Questão 49

O transtorno do desenvolvimento que ocorre em meninas que tenham apresentado desenvolvimento normal nos primeiros seis meses, seguido de uma grave deterioração evolutiva é denominado

A transtorno de Asperger.
B retardo mental.
C transtorno desintegrativo da infância.
D esquizofrenia com início na infância.
E transtorno de Rett.

Questão 50

A classe de medicamentos que podem ser considerados como primeira opção no tratamento de pacientes com fobia social é a dos

A antagonistas beta-adrenérgicos.
B neurolépticos atípicos.
C inibidores da MAO.
D inibidores da recaptação da serotonina.
E benzodiazepínicos.

Questão 51

Em relação ao transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), assinale a opção correta.

A A comorbidade do TDAH com os transtornos de oposição desafiante e/ou transtorno de conduta é rara.
B A taxa de prevalência do TDAH na população geral não sofre influência dos níveis socioeconômicos.
C A desatenção é um sintoma patognomônico do TDAH.
D O TDAH com o predomínio de desatenção está mais associado à depressão e ansiedade que a outras comorbidades.
E Para o diagnóstico no TDAH, tanto na criança quanto no adolescente ou no adulto, é necessário que os sintomas tenham se iniciado antes dos 5 anos de idade.

Questão 52

A respeito do transtorno factício ou síndrome de Münchhausen, assinale a opção correta.

A A hipocondria é um importante diagnóstico diferencial.
B Os sintomas do transtorno factício geralmente têm início na infância e adolescência.
C As motivações dos sintomas do transtorno factício são conscientes.
D Transtornos factícios costumam ter uma boa resposta ao uso de antipsicóticos atípicos.
E No transtorno factício, geralmente o paciente evita a realização de exames ou procedimentos médicos.

Questão 53

O entendimento de que o ato administrativo é considerado válido até que se prove em contrário corresponde ao atributo da

A presunção de legitimidade.
B tipicidade.
C exigibilidade.
D imperatividade.
E autoexecutoriedade.

Questão 54

Considerando o disposto na Lei n.º 8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos), julgue os seguintes itens.

I Embora tenha sido editada pela União, a Lei de Licitações e Contratos é considerada lei nacional, aplicando-se a todos os Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
II Quando a administração pública efetua compra de um produto não comum cujo valor é superior a um milhão, quatrocentos e trinta mil reais, deve-se utilizar a modalidade de licitação concorrência.
III No caso de aquisição de material que só possa ser fornecido por empresa exclusiva, a administração pública deverá realizar contratação direta mediante dispensa de licitação.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo.
B Apenas o item II está certo.
C Apenas os itens I e II estão certos.
D Apenas os itens II e III estão certos.
E Todos os itens estão certos.

Questão 55

Suponha que Ana, servidora do Tribunal de Justiça, agindo no exercício de suas funções administrativas, tenha causado dano a João.

Nessa situação hipotética, caso João pretenda ajuizar ação judicial requerendo indenização em face do Estado, a responsabilidade civil

A) será subjetiva, por meio de ação de regresso.
B) será objetiva, independentemente de dolo ou culpa.
C) será subsidiária, se comprovado dolo ou culpa.
D) não será possível, porque o Estado não responde pelos atos de seus agentes, devendo João ajuizar ação diretamente contra Ana.
E) não será possível, porque o Brasil adota a teoria da irresponsabilidade estatal.

Questão 56

O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nos casos em que

A) a aquisição de bens vier a atender mais de um programa de governo, podendo ser acrescida a quantidade prevista na ata de registro de preços.
B) houver necessidade de aquisição de bens com uma única entrega.
C) houver quantitativo exato do produto demandado pela administração.
D) a aquisição de bens vier a atender exclusivamente um órgão público.
E) houver necessidade de contratações frequentes, em razão das características do serviço.

Questão 57

É considerado direito social previsto na Constituição Federal de 1988

A) o décimo terceiro salário com base no salário básico.
B) a assistência aos desamparados, na forma da Constituição.
C) o salário-família pago em razão do dependente do trabalhador, independentemente da renda auferida.
D) o salário mínimo, sendo permitida sua vinculação para qualquer fim.
E) o seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário ou involuntário.

Questão 58

Conforme a Constituição Federal de 1988, as pessoas

A) estão autorizadas a fazer tudo desde que a lei não proíba.
B) estão, em princípio, proibidas a fazer tudo, podendo um decreto regulamentar presidencial permitir a atuação individual.
C) só estão autorizadas a fazer aquilo que está previsto em lei.
D) só podem fazer algo quando ato normativo legal ou infralegal expressamente permitir.
E) não podem ser obrigadas a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de ato normativo legal ou infralegal.

Questão 59

Ao Conselho Nacional de Justiça compete apreciar, de ofício ou mediante provocação,

A) o mérito dos atos administrativos praticados por membros do Poder Judiciário.
B) o mérito dos atos administrativos praticados por servidores ou membros do Poder Judiciário.
C) a legalidade dos atos administrativos praticados por servidores do Poder Judiciário.
D) a legalidade e o mérito dos atos administrativos praticados por servidores ou membros do Poder Judiciário.
E) a legalidade dos atos administrativos praticados por membros do Poder Judiciário.

Questão 60

Maria, que possui emprego público privativo de profissionais de saúde em empresa pública estadual, foi aprovada em outro concurso público para cargo público federal privativo de profissionais de saúde.

Nessa situação hipotética, Maria

A) não poderá acumular as funções, porque uma é estadual e a outra é federal.
B) não poderá acumular as funções, porque apenas um dos vínculos é oriundo do regime estatutário.
C) não poderá acumular as funções, porque não há previsão constitucional expressa que permita cumulações de funções públicas remuneradas.
D) poderá assumir o cargo e acumular as duas funções públicas, se os horários forem compatíveis e as profissões forem regulamentadas.
E) poderá assumir o cargo e acumular as duas funções públicas, não se aplicando a esse caso o teto remuneratório da administração pública.

Espaço livre